

RWA BÓR 150®**Kvapalný koncentrát bóru, obsah 150 g /l**

- ◆ regeneruje oslabený alebo suchom poškodený porast
- ◆ udržiava vitalitu a celkovú životaschopnosť porastu
- ◆ humínové kyseliny a aminokyseliny dodávajú silný rastový stimul

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIU

Plodina	Účel	Dávka
Všetky plodiny	zabezpečenie dostatku bóru	1–3 l/ha hnojením na list (200–400 l vody); 4–8 l/ha prihnojovaním do pôdy; aplikácia postrekovačom 0,5% koncentrácia
Obilniny	zvýšenie výnosov, zabezpečenie dostatku bóru	0,5–1 l/ha do konca odnožovania, nedostatok bóru detekovaný analýzou listu 2–3 l/ha na jeseň od 4. do 6. listu
Repka	rovnorné kvitnutie a dozrievanie, zvýšenie výnosu a zabezpečenie dostatku bóru	2–3 l/ha na jar do začiatku kvitnutia
Kukurica	kvalita peľu, nasadzovanie zrna, zvýšenie úrody zrna, zabezpečenie dostatku bóru	3 l/ha od fázy 4 listov
Zemiaky	vnútorná kvalita hlúz, zabezpečenie dostatku bóru	1–2 x 1 l/ha po uzatvorení riadkov
Cukrová repa	proti srdiečkovej a suchej hnilobe, zvýšenie výnosu, kvality a zabezpečenie dostatku bóru	1–2 x 3 l/ha v období od 6. listu do uzatvorenia riadkov
Chmeľ	rozvoj púčikov a listovej plochy, zvýšenie kvality	3–5 x 0,1 % postrek až do kvitnutia
Jadroviny	podpora produkcie peľu, kvitnutia, nasadzovania plodov, transportu vápnika	2–3 x 1 l/ha od štádia červených púčikov po kvitnutie
Kôstkoviny	kvitnutie, nasadzovanie plodov	1 l/ha začiatok kvitnutia
Jahody	vytvorenie kvetných a prezimujúcich púčikov, kvalita kvitnutia	2 l/ha na jeseň (pri výsadbách)
	podpora kvitnutia a nasadzovania plodov, proti deformovaným plodom	1 l/ha zelené až biele púčiky
Plodová zelenina	kvalita a sila mladých rastlín - poplazov	2 x 1 l/ha 14 a 7 dní pred objavením poplazov
	kvitnutie, nasadzovanie plodov, nedostatok bóru	1–2 x 2 l/ha pred začiatkom kvitnutia na listovú plochu
Kapustoviny a cibuľoviny	vnútorná kvalita, proti srdiečkovej a suchej hnilobe, zabezpečenie dostatku bóru	1–2 x 2–3 l/ha na dostatočne vyvinutú listovú plochu
Vinič	kvitnutie, nasadzovanie plodov, rovnomerné dozrievanie	2 x 1 l/ha od objavenia sa súkvetia po začiatok kvitnutia